

FELHASZNÁLÁS

EGYÉB NÖVÉNYI KULTÚRÁK



FONTOS: tapadásfokozóval (nedvesítőszerrel) együtt alkalmazza!

Egyéb növényi kultúrák

1. KATEGÓRIA	borsó, bab, csicsereiborsó, mustár, lencse, csillagfűrt, cukkini, uborka, paprika, paradicsom, sárgarépa, zeller, karalábe, petrezselyemgyökér, retek, hónapos retek, hagyma, póréhagyma, spenót, feketegyökér, torma*
2. KATEGÓRIA	saláta (minden típus)

FONTOS!

Az egyéb növényi kultúrákhoz tartozó fajták két kategóriába sorolhatók. A lehető legnagyobb siker elérése érdekében ezek mind eltérő kijuttatási módot igényelnek.

BBCH-skála 13, ill. a vegetációs időszak kezdetén	1. kijuttatás	2. kijuttatás (kb. 14 nappal az első kijuttatás után)	3. kijuttatás
1. KATEGÓRIA	3 l/ha	3 l/ha	3 l/ha
2. KATEGÓRIA	3 l/ha	3 l/ha	x

Torma – 3. KATEGÓRIA

1. kijuttatás	További kijuttatások
talpgyökerezés után 2,5 l/ha	További legalább 5 kijuttatást ajánlunk, (14 naponta) elosztva a vegetációs időszak során, 2,5 l/ha dózisban.

Szőlő

1. kijuttatás	2. kijuttatás	3. kijuttatás	4. kijuttatás
virágzás elején 2,5 l/ha	virágzás végén 2,5 l/ha	14 nappal az előző kijuttatást követően 2,5 l/ha	14 nappal az előző kijuttatást követően 2,5 l/ha

FONTOS!

A felhasznált össz mennyiség érje el a minimum 10 litert!

Alma/körte

1. kijuttatás	2. kijuttatás	3-6. kijuttatás
BBCH-skála 19-25 2,5 l/ha	kb. 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha	kb. 14 naponta 2,5 l/ha

Egyéb gyümölcsök

1. kijuttatás	2. kijuttatás	3-4. kijuttatás
BBCH-skála 19-25 2,5 l/ha	kb. 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha	kb. 14 naponta 2,5 l/ha

Földieper

Tavaszzal	1. kijuttatás BBCH-skála 13-15, kb. 10-15 cm-es növénymagasságnál 2,5 l/ha	2. kijuttatás 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha
	Késő nyáron	2. kijuttatás 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha

Spárga

1. kijuttatás virágzás elején 2,5 l/ha	2. kijuttatás virágzás végén 2,5 l/ha	3. kijuttatás 14 nappal az utolsó kijuttatást követően 2,5 l/ha	4. kijuttatás 14 nappal az utolsó kijuttatást követően 2,5 l/ha
--	---	---	---

FONTOS!

A felhasznált össz mennyiség érje el a minimum 10 litert!

Tökfélék

1. kijuttatás 2-3 leveles állapotban, 5-16 cm-es növénymagasságnál 2,5 l/ha	2. kijuttatás kb. 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha	3. kijuttatás* ha még belefér a vegetációs időszakba 2,5 l/ha
---	---	---

* kb. 14 nappal az utolsó kijuttatást követően

Komló

1. kijuttatás kb. 60 cm-es növénymagasságnál 2,5 l/ha	2. kijuttatás kb. 14 nappal az első kijuttatás után 2,5 l/ha	3. kijuttatás kb. 14 nappal az utolsó kijuttatást követően 2,5 l/ha	4. kijuttatás kb. 14 nappal az utolsó kijuttatást követően 2,5 l/ha
---	--	---	---

Erdészeti fafajok/fenyő

1. kijuttatás a vegetációs időszak kezdetétől 3,5 l/ha	2. kijuttatás kb. 14 nappal az első kijuttatást követően 3,5 l/ha	3. kijuttatás kb. 14 nappal az utolsó kijuttatást követően 3,5 l/ha
--	---	---

FONTOS!

Minden kijuttatásnál szükség van tapadásfokozó (nedvesítőszer) alkalmazására!
(amennyiben a vele együtt kijuttatott szer nem tartalmazza)

FELHASZNÁLÁS SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁKBAN

**FONTOS: tapadásfokozóval
(nedvesítőszerrel) együtt alkalmazza!**



Őszi kalászosok	
1. kijuttatás (ősszel)	2. kijuttatás (tavasszal)
BBCH-skála 13-16 vagy 3-6 leveles állapotban 2,5 l/ha	a vegetációs időszak kezdetétől 2,5 l/ha

Amennyiben az őszi kijuttatás elmaradt, akkor a következő alkalmazást javasoljuk:

1. kijuttatás (tavasszal)	2. kijuttatás
a vegetációs időszak kezdetétől 2,5 l/ha	kb. 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha

A zászlósvél kialakulása után a minőség javítására ajánlunk egy 3. kijuttatást, 2,5 l/ha dózisban.

Tavaszi kalászosok	
1. kijuttatás	2. kijuttatás
BBCH-skála 13-16 vagy 3-6 leveles állapotban 2,5 l/ha	kb. 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha

A zászlósvél kialakulása után a minőség javítására ajánlunk egy 3. kijuttatást, 2,5 l/ha dózisban.

Repce		
1. kijuttatás (ősszel)	2. kijuttatás (tavasszal)	3. kijuttatás
BBCH-skála 13-18 kb. 10-15 cm-es növénymagasságnál 2,5 l/ha	a vegetációs időszak kezdetétől 2,5 l/ha	kb. 14 nappal az utolsó kijuttatást követően 2,5 l/ha

Amennyiben az őszi kijuttatás elmaradt, akkor a következő alkalmazást javasoljuk:

1. kijuttatás (tavasszal)	2. kijuttatás	3. kijuttatás
a vegetációs időszak kezdetétől 2,5 l/ha	kb. 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha	kb. 14 nappal az utolsó kijuttatást követően 2,5 l/ha

Az AGROSOL liquid-deltörtető kezelést a virágzás ELŐTT be kell fejezni.

Kukorica	
1. kijuttatás	2. kijuttatás
BBCH-skála 13-15 vagy 3-5 leveles állapotban 2,5 l/ha	kb. 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha

Répafélék			
1. kijuttatás	2. kijuttatás	3. kijuttatás	4. kijuttatás
BBCH-skála 12-19 kb. 5-10 cm-es növénymagasságnál 2,5 l/ha	kb. 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha	14 nappal az utolsó kijuttatást követően 2,5 l/ha	14 nappal az utolsó kijuttatást követően 2,5 l/ha

Vető- és étkezési burgonya			
1. kijuttatás	2. kijuttatás	3. kijuttatás	4. kijuttatás
BBCH-skála 20 kb. 10-15 cm-es növénymagasságnál 2,5 l/ha	kb. 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha	14 nappal az utolsó kijuttatást követően 2,5 l/ha	14 nappal az utolsó kijuttatást követően 2,5 l/ha

Élelmiszeripari- és keményítőburgonya			
1. kijuttatás	2. kijuttatás	3. kijuttatás	4. kijuttatás
BBCH-skála 40 sorzáródás után 2,5 l/ha	kb. 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha	14 nappal az utolsó kijuttatást követően 2,5 l/ha	14 nappal az utolsó kijuttatást követően 2,5 l/ha

ÁLTALÁNOSÁGBAN ARRÁ KELL FIGYELNI, hogy a korai kijuttatás (10-15 cm-es növénymagasságnál) a gumóképződést fokozza.

Napraforgó		
1. kijuttatás	2. kijuttatás	3. kijuttatás*
BBCH-skála 13-21 kb. 5-16 cm-es növénymagasságnál 2,5 l/ha	kb. 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha	ha a vegetációs állapot engedi 2,5 l/ha

* kb. 14 nappal az utolsó kijuttatást követően

Szójabab		
1. kijuttatás	2. kijuttatás	3. kijuttatás*
BBCH-skála 13-21 kb. 5-16 cm-es növénymagasságnál 2,5 l/ha	kb. 14 nappal az első kijuttatást követően 2,5 l/ha	ha a vegetációs állapot engedi 2,5 l/ha

* kb. 14 nappal az utolsó kijuttatást követően

Zöldtakarmány/lóhere/tömegetakarmány			
1. kijuttatás	2. kijuttatás	3. kijuttatás	4. kijuttatás
a tenyészidőszak kezdetétől, 3 cm sarjadéktól 3 l/ha	*	*	*
	3 l/ha	3 l/ha	3 l/ha

* kaszálások után 3 cm-es sarjú elérésénél, szerves trágyázás után 2 napot várni kell

FONTOS!

**Minden esetben szükség van tapadásfokozó
(nedvesítőszer) alkalmazására!**
(amennyiben a vele együtt kijuttatott szer nem tartalmazza)

www.agrosolution.com