

## >>> Struguri

1. aplicare	2. aplicare	3. aplicare	4. aplicare
înainte de înflorire	după înflorire	la aprox. 14 zile de la ultima aplicare	la aprox. 14 zile de la ultima aplicare
1,5 kg/ha	3 kg/ha	3 kg/ha	3 kg/ha

### >>> INFORMAȚII:

Cantitatea totală utilizată să nu fie mai puțină de 10,5 kg.

## >>> Alte culturi vegetale

<b>1. CATEGORIE</b>	mazăre verde   fasole   năut   muștar   linte   lupin
<b>2. CATEGORIE</b>	zucchini   castraveți   ardei   roșii
<b>3. CATEGORIE</b>	morcovi   țelină   gulie   pătrunjel   ridichi   sparanghel   ridichi de lună   ceapă   praz   spanac
<b>4. CATEGORIE</b>	agrisă   merișoare   zmeură   mure soc   scoruș negru   coacăze   affine   căpșuni* mere   pere   gutuie   corcoduș   piersici   prune   cireșe
<b>5. CATEGORIE</b>	Toate felurile de salate

### >>> INFORMAȚII:

Alte culturi vegetale și tipurile de plante aferente sînt clasificate în a 5-a CATEGORIE. Pentru a obține cel mai mare succes posibil toate acestea necesită metode de tratare diferite.

### Aplicare/dozare:

	1. aplicare	2. aplicare	3. aplicare	4. aplicare
1. CATEGORIE	2,5 kg/ha	3 kg/ha	3 kg/ha	x
2. CATEGORIE	2 kg/ha	3,5 kg/ha	3,5 kg/ha	x
3. CATEGORIE	3 kg/ha	3 kg/ha	3 kg/ha	x
4. CATEGORIE	1,5 kg/ha	3 kg/ha	3 kg/ha	3 kg/ha
5. CATEGORIE	3 kg/ha	3 kg/ha	x	x

\* cu excepția CĂPȘUNILOR (4. CATEGORIE)

Primăvara	La începutul verii
<b>1. aplicare:</b> Nivelul 13-15 al scalei BBCH aproximativ la o înălțime de 10 – 15 cm a plantelor 2 kg/ha	<b>1. aplicare:</b> Nivelul 13-15 al scalei BBCH aproximativ la o înălțime de 10 – 15 cm a plantelor 2 kg/ha
<b>2. aplicare:</b> aprox. cu 14 zile după prima aplicare 3 kg/ha	<b>2. aplicare:</b> aprox. cu 14 zile după prima aplicare 3 kg/ha

#### APLICARE GENERALĂ:

Prima stropire: 1,5 kg/ha se poate stropi de la stadiul cu 2 frunze

Aplicări ulterioare: 3 kg/ha: Dacă pulverizați AGROSOLution pe frunziș mai des, atunci puteți folosi 3 kg/ha.

Frecvența aplicărilor: În intervale regulate de 10-14 zile în timpul perioadei de vegetație

## APLICARE

### Aplicare și condiții tehnice

- AGROSOLution trebuie amestecat cu aproximativ 200-400 litri de apă (pe 1 hectar) și aplicat pe frunze ca pulbere fin.
- Presiunea ideală de lucru este 3-4 bari cu cap de pulverizare cu un diametru de 150-300 μm.
- În timp ce umpleți cu apă rezervorul de pulverizare să adăugați AGROSOLution încet și uniform.
- Vă rugăm să fiți atenți să dispersați produsul ca pulbere fină, ca ceața!

#### IMPORTANT:

În cazul pauzelor mai lungi este INTERZISĂ stingerea omogenizatorului, sau materialul TREBUIE amestecat corespunzător înainte de următoarea utilizare, ca mineralele să nu să deponă.

### Instrucțiuni de utilizare

- Pulverizarea cu AGROSOLution trebuie adaptată vremii, deoarece absorbirea al AGROSOLution ține aprox. 2-4 ore (în funcție de cultura vegetală).
- Umeziți doar ușor frunzele plantelor.
- Pentru a evita înfundarea instalația de pulverizat după utilizare **TREBUIE SPĂLAT TEMEINIC!** Capurile de pulverizare inferioare trebuie scoase după curățare, ca restul să poată să se scurgă.
- AGROSOLution se poate amesteca cu orice îngrășământ sau pesticid comercializat.
- Prima dată apa trebuie turnată în rezervor, apoi se poate adăuga AGROSOLution cu amestecare permanentă.
- APARAT DE PULVERIZARE CU REZERVOR FRONTAL:** Pentru evitarea producerii prafului AGROSOLution trebuie adăugat direct în apa de pulverizare cu amestecare permanentă.

### Informații de siguranță

- Aveți grijă să nu inhalați AGROSOLution în timpul pulverizării.
- A se ține închis de copii și animale domestice.
- A se depozita în loc răcoros și uscat.

#### IMPORTATOR GENEREAZĂ Ungaria și România:

INOV CO2 s.r.o.  
SK-94501 Komárno, Komenského 22,  
Tel.: +36 1 7977 217, Fax: +36 1 7998 877, office@agrosolution.ro  
www.agrosolution.ro

Comerciant:

**AGROSOLUTION**  
ENERGIE PUR VEGETALĂ



# CONSPECTARE

## Soiuri de plante, aplicări și dozare

**PROPUNERE:**  
La fiecare aplicare  
este recomandat să  
folosiți adjuvant!

www.agrosolution.ro

## >>> Cereale de toamnă

1. aplicare (toamna)	2. aplicare (primăvara)	3. aplicare	4. aplicare
Nivelul 13-16 al scalei BBCH sau faza cu 3-6 frunze	de la începutul perioadei de vegetație	x	x
<b>2 kg/ha</b>	<b>3,5 kg/ha</b>		

Cantitatea de 5,5 kg împărțită în 3 aplicări mai poate crește efectul dorit:  
 1. aplicare: **2 kg/ha** (gradul 13-16 la scala BBCH sau stadiul cu 3-6 frunze)  
 2. aplicare: **1,5 kg/ha** (de la începutul perioadei de vegetație)  
 3. aplicare: **2 kg/ha** (cu aprox. 14 zile după ultima aplicare)

Dacă tratarea de toamnă a fost omisă, atunci cu 2 aplicări de primăvară se poate obține aceeași efect >>>

1. aplicare (primăvara)	2. aplicare	3. aplicare	4. aplicare
de la începutul perioadei de vegetație	aprox. cu 14 zile după prima aplicare	x	x
<b>3 kg/ha</b>	<b>3 kg/ha</b>		

Dacă cantitatea de material de 6 kg o împărțiți în 3 aplicări, atunci astfel puteți crește și mai mult efectul dorit:  
 1. aplicare: **2 kg/ha** (de la începutul perioadei de vegetație)  
 2. aplicare: **2 kg/ha** (aprox. cu 14 zile după prima aplicare)  
 3. aplicare: **2 kg/ha** (aprox. cu 14 zile după ultima aplicare)

## >>> Cereale de primăvară

1. aplicare	2. aplicare	3. aplicare	4. aplicare
Nivelul 13-16 al scalei BBCH sau faza cu 3-6 frunze	aprox. cu 14 zile după prima aplicare	x	x
<b>2 kg/ha</b>	<b>3,5 kg/ha</b>		

Dacă cantitatea de material de 6 kg o împărțiți în 3 aplicări, atunci astfel puteți crește și mai mult efectul dorit:  
 1. aplicare: **2 kg/ha** (Nivelul 13-16 al scalei BBCH sau faza cu 3-6 frunze)  
 2. aplicare: **2 kg/ha** (aprox. cu 14 zile după prima aplicare)  
 3. aplicare: **2 kg/ha** (kb. 14 nappal az utolsó kezelés után)

## >>> Porumb

1. aplicare	2. aplicare	3. aplicare	4. aplicare
Nivelul 13-15 al scalei BBCH sau faza cu 3-5 frunze	aprox. cu 14 zile după prima aplicare	x	x
<b>2 kg/ha</b>	<b>3,5 kg/ha</b>		

Dacă cantitatea de material de 6 kg o împărțiți în 3 aplicări, atunci astfel puteți crește și mai mult efectul dorit:  
 1. aplicare: **2 kg/ha** (Nivelul 13-15 al scalei BBCH sau faza cu 3-5 frunze)  
 2. aplicare: **2 kg/ha** (cu aprox. 14 zile după prima aplicare)  
 3. aplicare: **2 kg/ha** (aprox. cu 14 zile după ultima aplicare)

## >>> Soiuri de cartofi de sămânță, pentru consum și cu conținut ridicat de amidon

1. aplicare	2. aplicare	3. aplicare	4. aplicare
Nivelul 20 pe scala BBCH la o înălțime de plantă de aprox. 10-15 cm	aprox. cu 14 zile după prima aplicare	aprox. cu 14 zile după ultima aplicare	aprox. cu 14 zile după ultima aplicare
<b>2 kg/ha</b>	<b>3 kg/ha</b>	<b>3 kg/ha</b>	<b>2 kg/ha</b>

## >>> Cartofi destinați prelucrării în industria alimentară\*

1. aplicare	2. aplicare	3. aplicare	4. aplicare
Nivelul 40 al scalei BBCH după ce plantele umple spațiul dintre rânduri	aprox. cu 14 zile după prima aplicare	aprox. cu 14 zile după ultima aplicare	aprox. cu 14 zile după ultima aplicare
<b>3 kg/ha</b>	<b>3 kg/ha</b>	<b>2 kg/ha</b>	<b>2 kg/ha</b>

\* pe cât e posibil cartofi mari fără creșterea numărului ramificațiilor

## >>> Rapița

1. aplicare (toamna)	2. aplicare (primăvara)	3. aplicare	4. aplicare
Nivelul 13-18 al scalei BBCH aproximativ la o înălțime de 10 – 15 cm a plantelor	de la începutul perioadei de vegetație	aprox. cu 14 zile după ultima aplicare	x
<b>2 kg/ha</b>	<b>2,5 kg/ha</b>	<b>3 kg/ha</b>	

Dacă nu are loc aplicarea de toamnă, atunci se poate obține aceeași efect cu 3 aplicări de primăvară >>>

1. aplicare (primăvara)	2. aplicare	3. aplicare	4. aplicare
de la începutul perioadei de vegetație	aprox. cu 14 zile după prima aplicare	aprox. cu 14 zile după ultima aplicare	x
<b>2,5 kg/ha</b>	<b>2,5 kg/ha</b>	<b>3 kg/ha</b>	

## >>> Culturi de sfeclă

1. aplicare	2. aplicare	3. aplicare	4. aplicare
Nivelul 13-21 al scalei BBCH aprox. la o înălțime de 5 – 16 cm a plantelor	aprox. cu 14 zile după prima aplicare	aprox. cu 14 zile după ultima aplicare	aprox. cu 14 zile după ultima aplicare
<b>2 kg/ha</b>	<b>3 kg/ha</b>	<b>3 kg/ha</b>	<b>2 kg/ha</b>

## >>> Soia

1. aplicare	2. aplicare	3. aplicare*	4. aplicare
Nivelul 13-21 al scalei BBCH aprox. la o înălțime de 5 – 16 cm a plantelor	aprox. cu 14 zile după prima aplicare	cum permite starea vegetală	x
<b>2,5 kg/ha</b>	<b>3 kg/ha</b>	<b>3 kg/ha</b>	

\* aprox. cu 14 zile după ultima aplicare

## >>> Floarea soarelui

1. aplicare	2. aplicare	3. aplicare*	4. aplicare
Nivelul 13-21 al scalei BBCH aprox. 5 - 16 cm înălțime de plantă	aprox. cu 14 zile după prima aplicare	cum permite starea vegetală	x
<b>2 kg/ha</b>	<b>3,5 kg/ha</b>	<b>2 kg/ha</b>	

\* aprox. cu 14 zile după ultima aplicare

## >>> Bostănoase

1. aplicare	2. aplicare	3. aplicare*	4. aplicare
Nivelul 2-3 al scalei BBCH aprox. înălțime de plantă de 5-16 cm	aprox. cu 14 zile după prima aplicare	cum permite starea vegetală	x
<b>2 kg/ha</b>	<b>3,5 kg/ha</b>	<b>2 kg/ha</b>	

\* aprox. cu 14 zile după ultima aplicare

## >>> Nutreț verde / Lucernă / Trifoi

1. aplicare	2. aplicare	3. aplicare	4. aplicare
De la începutul perioadei de vegetație, de la înălțimea vâstarului de 3 cm	*	*	*
<b>3 kg/ha</b>	<b>3 kg/ha</b>	<b>3 kg/ha</b>	<b>3 kg/ha</b>

\* după fiecare tăiere, la înălțime de vâstar de 3 cm - după aplicarea mustului de bălegar trebuie așteptat 2 zile cu aplicare